

住まいの主な害虫Q&A

ダニ



Q1.ダニの発生しやすい時期はいつですか？

A1.梅雨時は、要注意

ダニは一年中繁殖し、日本の住宅には10種類以上もいるといわれています。ダニが繁殖しやすいのは、高温多湿の時。特に梅雨時は発生しやすいので、注意が必要です。常に換気を心がけ、こまめなお掃除をしましょう。

Q2.ダニが健康に及ぼす影響は？

A2.アレルギーの原因になることも

ダニは種類によって害もいろいろです。畳を食べるコナダニやフケを好むチリダニは、ぜん息やアレルギーの原因にもなります。また、イエダニやツメダニは人に噛みついたり、血を吸ったりします。ふだんから市販のダニ用殺虫剤などで駆除することが大切です。

Q3.ダニ対策は？

A3.畳の上にカーペットは敷かない

畳が持つ吸放湿性を妨げると湿気がこもり、ダニが発生する原因になります。ダニの繁殖を防ぎ、駆除しやすくするため、畳の上にカーペットを敷くことは避けてください。どうしても敷く必要がある場合は、こまめに取り外して掃除するようにしてください。

こまめなお掃除が大切

畳、カーペットはこまめにダニ退治機能付きの掃除機をかけたり、日光に当てて駆除します。寝具のシーツ・カバー類はこまめに洗濯し、布団や枕は日干した後に掃除機をかけると効果的です。またダニはベットにも繁殖します。市販の忌避剤や駆除アイテムを使い、予防することが大切です。



黒アリ



Q1.黒アリが室内に侵入する原因是？

A1.部屋の中に黒アリが入ってくる原因是食べ物です。基本的に黒アリは砂糖といった甘いもの、ごはんや小麦粉や動物性たんぱく質を含む食材を好みます。テーブルの下や床下などに食べ物や食べ物のカスなどが落ちていると外から侵入してしまう可能性があります。サッシのすき間から侵入してくることも多く、小さいのではんの小さなすき間でも簡単に侵入できてしまうのです。

Q2.黒アリ対策は？

A2.室内への侵入をしっかり防ぐ

黒アリのエサとなる食品を残さず、常に清潔にしておくことが、黒アリの侵入を防ぐ一番の対策です。また、羽アリは春から秋に発生し、照明の明かりに誘引されて飛んできます。窓用の殺虫剤を用いて、室内に寄せつけないようにしましょう。気温が高まり、梅雨時期で湿度が高まると、黒アリの活動が盛んになってきます。その前に黒アリ対策をしておきましょう。

ゴキブリ



Q1.ゴキブリはどこから発生しますか？

A1.ゴキブリは、ベランダ、玄関、窓、小さなすき間など、外からやってくる

室内に卵を産んでしまうのは、もともとは外から侵入したゴキブリです。特に嗅覚が優れているので、匂いにつられて行動し、室内に侵入してきます。

Q2.ゴキブリ対策は？

A2.キッチンはいつも清潔に

キッチンはハエ・蚊・ゴキブリなどの害虫が発生しやすい場所。いつも清潔にしておくことが大切です。キッチンの生ゴミはこまめに捨て、流し台などに残飯が残らないようにするのがポイント。こまめなお掃除でキレイなキッチンを保つことが、一番のゴキブリ対策です。

しっかり駆除が基本

ゴキブリは、衛生的に害がある虫です。伝染病の予防のためにもしっかり駆除してください。こまめに掃除し、そのうえで殺虫剤やゴキブリ取りなどを使うと効果的。湿気の多いところを好むので、常に換気を心がけましょう。殺虫剤などの薬品は説明書をよく読み、取り扱いに十分注意してください。



**「らいさぽ」の“カビバスター ホーム・ゲル150”で
ダニ・ゴキブリ対策を**

※“カビバスター ホーム・ゲル150”には、ダニ・ゴキブリ・ネズミの忌避データもあります。

“カビバスター ホーム・ゲル150”は、
オーナー様専用Webサイト内「らいさぽ」で購入できます。

トヨタホーム オーナーズクラブ

検索

害虫対策
害虫の活動が
最盛期を迎える
予防しましょ
夏本番前にしつかり

オーナー様からお問い合わせの多い、不快な害虫への対策方法。トヨタホームは機密性の高い構造体ですが、床下の湿気対策のためにすき間や通気孔を設けているため、その小さなすき間から害虫が侵入してしまうことがあります。害虫が本格的な活動期を迎える、夏本番前にしつかりと予防を行いましょう。



[技術監修] 植月 英貴

トヨタホーム アフターサービス
担当DIYアドバイザー

わが家を
いつまでも快適に！

誌上
メンテナンス
講座

vol.48


害虫
対策

パックナンバーは、OWNER'S WEBで

シロアリにも注意しましょう

シロアリ


シロアリが他の生物と大きく異なる点は、
大多数の生物の栄養源がデンプンであるのに対し、
シロアリは、樹木の成分である
セルロースを栄養源としていることです。
鉄骨住宅はシロアリによる被害を受けにくい構造で、
構造躯体である鉄部は被害を受けませんが、
木部は地域や湿気状況によって被害を受ける場合があります。



Q1. シロアリと黒アリの見分け方は?

A1.

	シロアリの羽アリ	黒アリの羽アリ
部位	①触覚	数珠状
	②羽根	「く」の字状
部位	③胸	前後同じ大きさ
	くびれ無し	くびれ有り




Q2. シロアリの種類は?

A2. 日本では「ヤマトシロアリ」と「イエシロアリ」が知られています。

Q3. 「ヤマトシロアリ」と「イエシロアリ」の違いは?

A3.

	ヤマトシロアリ	イエシロアリ
形	兵蟻 働蟻 	兵蟻 働蟻
羽根の色	黒色	透明
群飛期	4月上旬～5月中旬	6月～7月
被害	被害はイエシロアリほどではない。専門業者による駆除が必要。土中等に高含水率の木材がある場合、これを起点として高さ1m以内までの木材を食害する。	被害は強烈。専門業者による駆除が必要。千葉県以西の温暖な海岸部地域に分布。



Q4. シロアリの発生しやすい場所は?

A4. 鉄骨住宅でも框や幅木、敷居、畳寄せ、床の間等の仕上材や壁枠等の下地材が食害を受けやすく、被害が水平方向に広がる特徴があります。

シロアリを発生させないための注意点

- 基礎の換気口を塞がない
(換気口の前に、物や植栽などを置かない。
換気が悪くなり、空気が湿り気をおびて濁ると、白アリの好む環境になります。)
- ウッドデッキやガーデニング用の木材には防蟻処理をする
- 玄関のそうじは、水をまいて行わない
(玄関の木部部分が水で濡れたり湿ったりすると白アリが集まる原因となります。)
- 家の周り(庭や敷地周辺)に木材を放置しない